

# Pravděpodobnostní metody ve strojírenství

## 3. Náhodná veličina



# 3. Náhodná veličina

- Klíčové pojmy:**
- Náhodná veličina, diskrétní, spojitá;
  - Rozdělení pravděpodobnosti, distribuční funkce;
  - pravděpodobnostní funkce, hustota pravd.;
  - Střední hodnota n.v., centrální momenty (rozptyl, směrodatná odchylka, šikmost, špičatost);
  - p-kvantil rozdělení n.v.;
  - medián, modus;

- Klíčové vztahy:**
- Alternativní model
  - Binomický model
  - Hypergeometrický model
  - Geometrický model
  - Model rovnoměrného rozdělení

## Co máme?

1. elementární náhodné jevy  $\Omega$

2. jevové pole  $\mathcal{F}$ : (1)  $\emptyset \in \mathcal{F}$

$$(2) A \in \mathcal{F} \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{F}$$

$$(3) A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$$

3. Pravděpodobnost (a)  $\forall A \in \mathcal{F} : P(A) \in \langle 0, 1 \rangle$

$$(b) P(\emptyset) = 0, \quad P(\Omega) = 1$$

(c) jsou-li  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ , po dvou disjunktní, potom

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

$\Rightarrow (\Omega, \mathcal{F}, P)$  .... pravděpodobnostní prostor

## Co nám chybí?

4. Náhodná veličina:  $X : \Omega \rightarrow \mathbf{R}$

Přesněji: měřitelná funkce  $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbf{R}, \mathcal{B})$

$$\forall x \in \mathbf{R} : \{ \omega \in \Omega : X(\omega) \leq x \} \in \mathcal{F}$$

$$P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\}) = F(x), \quad x \in \mathbf{R}$$



# Náhodná veličina

$$X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbf{R}, \mathcal{B})$$

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in (-\infty, x]\} \in \mathcal{F}$$

$$\{X \leq x\} \in \mathcal{F}$$

Distribuční funkce náhodné veličiny:  $F(x) = P(X \leq x), \quad x \in \mathbf{R}$



Distribuční funkce odpovídá na otázku: S jakou pravděpodobností náhodná veličina nepřekročí hodnotu  $x$ ?

Pro distribuční funkci platí:

1) je neklesající  $x \leq y \Rightarrow \{X \leq x\} \subset \{X \leq y\} \Rightarrow P(X \leq x) \leq P(X \leq y) \Rightarrow F(x) \leq F(y)$ .

2)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} P(X \leq x) = 0 ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} P(X \leq x) = 1$

3)  $F(x)$  je zprava spojitá  $\lim_{x \rightarrow x_0+} F(x) = F(x_0)$



# Náhodná veličina

$$X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbf{R}, \mathcal{B})$$

Rozlišujeme dva případy:

Náhodná veličina je funkce z  $\Omega$  do



- a) spočetné podmnožiny  $S \subset \mathbf{R}$
- b) souvislé podmnožiny  $Q \subset \mathbf{R}$

diskrétní náhodná veličina


spojitá náhodná veličina

a) Diskrétní náhodná veličina:

- obor hodnot =  $\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$
- pravděpodobnostní funkce:  $P(X=x_i) = p_i, i=1, 2, \dots$

vždycky musí platit, že  $p_i \in \langle 0, 1 \rangle, \sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$

- distribuční funkce:  $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{i=1: x_i \leq x}^{\infty} p_i, x \in \mathbf{R}$



# Náhodná veličina

$$X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbf{R}, \mathcal{B})$$

Rozlišujeme dva případy:

Náhodná veličina je funkce z  $\Omega$  do


- a) spočetné podmnožiny  $S \subset \mathbf{R}$
- b) souvislé podmnožiny  $Q \subset \mathbf{R}$

b) Spojitá náhodná veličina:

- obor hodnot =  $(a, b)$  či  $[a, \infty)$  nebo celé  $\mathbf{R}$
- nutně platí:  $P(x) = 0, \forall x \in (a, b)$
- hustota pravděpodobnosti: nezáporná, spojitá funkce  $f(x)$  pro kterou platí:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt, \quad \forall x \in \mathbf{R}$$

vždycky musí být  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$



# Charakteristiky náhodné veličiny - Momenty

Střední hodnota:  $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x dF(x)$

a) v případě diskrétní náhodné veličiny  $E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$

b) v případě spojité náhodné veličiny  $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$


---

Střední hodnota je lineární funkcionál:

je aditivní:  $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

a je homogenní:  $E(kX) = kE(X), \quad k \in \mathbf{R}$

Střední hodnota tvoří jakési  
“těžiště rozdělení” náhodné veličiny:



## Charakteristiky náhodné veličiny - Momenty

**Obecné momenty:**  $\mu_k(X) = E(X^k) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k dF(x)$

$\mu_k(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$  v diskrétním případě (pro d.n.v.)

$\mu_k(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k f(x) dx$  ve spojitém případě (pro s.n.v.)

**Centrální momenty:**  $X_C = X - E(X) = X - \mu$  ..... centrovaná náhodná veličina

$\nu_k(X) = E(X_C^k) = E(X - \mu)^k = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^k dF(x)$

1)  $\nu_1(X) = E(X_C) = E(X - \mu) = E(X) - \mu = E(X) - E(X) = 0$



## Charakteristiky náhodné veličiny - Momenty

$$\begin{aligned} 2) \quad \nu_2(X) &= E(X - \mu)^2 = E(X^2 - 2\mu X + \mu^2) = E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2 \\ &= E(X^2) - 2(E(X))^2 + (E(X))^2 = E(X^2) - (E(X))^2 \\ &= \mu_2(X) - (\mu_1(X))^2 \end{aligned}$$

druhý centrální moment = **rozptyl**:  $Var(X) = E(X - EX)^2 = \mu_2 - \mu_1^2$   
(míra variability)

odvozenou charakteristikou je  
**směrodatná odchylka**:

$$\sigma(X) = \sqrt{Var(X)} = \sqrt{E(X - \mu)^2} = \sqrt{\nu_2}$$

další odvozenou charakteristikou je  
**variační koeficient**:

$$V = \frac{\sigma(X)}{E(X)} = \frac{\sqrt{(\nu_2)}}{\mu_1}$$

3) Třetí centrální moment je mírou  
symetrie; **koeficient šikmosti**:

$$Skew(X) = \frac{E(X - EX)^3}{(Var(X))^{3/2}} = \frac{\nu_3}{\mu_2^{3/2}}$$

4) Čtvrtý centrální moment je mírou  
koncentrace; **koeficient špičatosti**:

$$Kurt(X) = \frac{E(X - EX)^4}{(Var(X))^2} = \frac{\nu_4}{\mu_2^2}$$



# Charakteristiky náhodné veličiny - Kvantily

**Kvantilová funkce:**  $\tilde{x}_\alpha = F^-(\alpha)$

Často se ptáme: Jakou hodnotu sledovaná náhodná veličina nepřekročí s danou pravděpodobností?

... tedy pro zadané  $\alpha \in (0, 1)$  hledáme  $\tilde{x}_\alpha \in \mathbf{R}$  tak, že  $F(\tilde{x}_\alpha) \leq \alpha$

- je-li  $F(x)$  spojitá a prostá, potom je  $\tilde{x}_\alpha = F^{-1}(\alpha)$
- v ostatních případech je to taková maximální hodnota  $\tilde{x}_\alpha$ , pro kterou platí:  $P(X \leq \tilde{x}_\alpha) \geq \alpha$  a zároveň  $P(X < \tilde{x}_\alpha) \leq \alpha$  (tzv. pseudoinverze).
- někdy hovoříme o  $\tilde{x}_\alpha$  jako o  $\alpha$ -kvantili nebo o  $100\alpha\%$ -kvantili náhodné veličiny  $X$ .

Patří sem:

- minimum ( $\tilde{x}_0$ ), maximum ( $\tilde{x}_{1,0}$ ),
- medián ( $\tilde{x}_{0,5}$ ),
- dolní decil ( $\tilde{x}_{0,1}$ ) a horní decil ( $\tilde{x}_{0,9}$ ),
- dolní kvartil ( $\tilde{x}_{0,25}$ ), horní kvartil ( $\tilde{x}_{0,75}$ )
- a další ....



## Charakteristiky náhodné veličiny - další ...


Patří sem například :

- modus (nejpravděpodobnější hodnota)
- rozpětí ( $\tilde{x}_1 - \tilde{x}_0$ ),
- mezikvartilová odchylka ( $\tilde{x}_{0,75} - \tilde{x}_{0,25}$ )
- a další ....

v diskrétním případě:  $x_{\text{mod}} = \max\{p_i; i = 1, 2, \dots\}$

ve spojitém případě:  $x_{\text{mod}} = \operatorname{argmax}\{f(x); x \in \mathbf{R}\}$

$$P(X = x_0) = 0$$
$$P(X \in \langle x_0; dx \rangle) \doteq f(x_0)dx$$



# Charakteristiky náhodné veličiny - ...

Charakteristiky podle funkce:


- míry polohy - posouvají se s náhodnou veličinou:  
je-li  $\theta$  mírou polohy veličiny  $X$ , potom veličina  $X+d$  má míru polohy  $\theta+d$   
(patří sem střední hodnota, kvantily, modus, ...)
- míry rozptýlenosti (variability) - jsou invariantní vůči posunutí:  
je-li  $\vartheta$  mírou variability veličiny  $X$ , potom je mírou variability i veličiny  $X+d$   
(patří sem rozptyl, směrodatná odchylka, různá rozpětí, ...)
- míry symetrie (šikmost)

označíme-li šikmost =  $\gamma$ , potom

$\gamma > 0$  – zešikmené zprava (doleva)

$\gamma = 0$  – symetrické

$\gamma < 0$  – zešikmené zleva (doprava)



# Rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny - různé modely

**Pravděpodobnostní model** = popis experimentu, při němž se realizuje náhodná veličina (jedna či více) s nějakým rozdělením pravděpodobnosti

$$\Rightarrow (\Omega, \mathcal{F}, P) \dots \text{pravděpodobnostní prostor}$$

## 1) Model diskrétního rovnoměrného rozdělení

Experiment, při němž může nastat jeden z  $n$  možných výsledků. Předpokládáme, že každý z nich je stejně možný, tedy všechny mají stejnou pravděpodobnost.


$$\Omega = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}, \quad X \in \{x_1, x_2, \dots, x_n\}, \quad P(X=x_i) = 1/n, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$$

$$Var(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2$$

$$X \in \{1, 2, \dots, n\} \Rightarrow E(X) = \frac{n+1}{2}$$

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{n^2 - 1}{12}$$



$$E(X^2) = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$



# Rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny - různé modely

## 2) Alternativní model (model alternativního rozdělení)

Experiment, při němž může nastat pouze jeden ze dvou možných výsledků.

$$\Omega = \{a_1, a_2\}, \quad X \in \{0, 1\}, \quad P(X=1) = p \Rightarrow P(X=0) = 1-p$$

$$E(X) = 0 \cdot (1-p) + 1 \cdot p = p \quad E(X^2) = 0^2 \cdot (1-p) + 1^2 \cdot p = p$$

$$Var(X) = E(X^2) - (E(x))^2 = p - p^2 = p(1-p)$$

## 3) Bernoulliho model (model binomického rozdělení)

Experiment, při němž opakujeme  $n$ -krát nezávisle na sobě alternativní pokus za stejných podmínek. Zajímá nás počet „úspěchů“, tedy kolikrát nastal výsledek „1“.

absolutní četnost kladných výsledků = součet pozorování  $Y = \sum_{i=1}^n X_i$

$$P(Y = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n. \quad Y \sim Bin(n, p)$$

- Cvičení: 1) Ukažte, že součet těchto pravděpodobností je roven jedné.  
2) Spočtěte střední hodnotu a rozptyl veličiny  $Y$  podle definice.



## Rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny - různé modely

### 3) Bernoulliho model (model binomického rozdělení)

absolutní četnost kladných výsledků = součet pozorování  $Y = \sum_{i=1}^n X_i$

$$E(Y) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = np \quad Var(Y) = E(Y - np)^2 = np(1 - p)$$

relativní četnost kladných výsledků = aritmetický průměr pozorování  $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n} np = p$$

$$Var(\bar{X}) = E(\bar{X} - p)^2 = \frac{p(1 - p)}{n}$$



# Rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny - různé modely

## 3) Bernoulliho model (model binomického rozdělení)

Experiment, při němž z množiny  $N$  prvků, mezi nimiž je  $M$  prvků s určitou vlastností, vybíráme náhodně postupně  $n$  prvků tak, že po každém výběru vybraný prvek vrátíme zpět mezi ostatní. Zajímá nás kolikrát vybereme prvek s danou vlastností.

$$P(\text{vybereme prvek s danou vlastností}) = \frac{M}{N}, \quad Y = \text{počet vybraných prvků s danou vlastností}$$

$$P(Y = k) = \binom{N}{n} \left(\frac{M}{N}\right)^k \left(1 - \frac{M}{N}\right)^{n-k}$$

počet  $k$ -tic  
v  $n$  prvcích

↑  
 $k$ -krát vybereme prvek  
s pravděpodobností  $\frac{M}{N}$

↑  
 $(n-k)$ -krát vybereme prvek  
s pravděpodobností  $(1 - \frac{M}{N})$

$$Y \sim Bin\left(n, \frac{M}{N}\right)$$



# Rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny - různé modely

## 3) Bernoulliho model (model binomického rozdělení)

Experiment, při němž z množiny  $N$  prvků, mezi nimiž je  $M$  prvků s určitou vlastností, vybíráme náhodně postupně  $n$  prvků tak, že po každém výběru vybraný prvek vrátíme zpět mezi ostatní. Zajímá nás kolikrát vybereme prvek s danou vlastností.

$$P(\text{vybereme prvek s danou vlastností}) = \frac{M}{N}, \quad Y = \text{počet vybraných prvků s danou vlastností}$$

$$P(Y = k) = \binom{N}{n} \left(\frac{M}{N}\right)^k \left(1 - \frac{M}{N}\right)^{n-k} \quad Y \sim Bin\left(n, \frac{M}{N}\right)$$


**Příklad 1:** Házení kostkou: házíme třemi hracími kostkami současně (nebo jednou třikrát po sobě). Jaká je pravděpodobnost, že padnou alespoň dvě šestky?

**Příklad 2:** Kontrola jakosti: Z výrobní linky oddebíráme nezávisle na sobě 10 výrobků. Víme, že v produkci jsou 3% vadných. Jaká je pravděpodobnost, že při výběru vybereme alespoň 1 zmetek?

**Příklad 3:** Losování zaměstnance: každý den v týdnu losujeme jednoho z 15ti zaměstnanců, který provede odpolední úklid. Mezi zaměstnanci 10 žen. Jaká je pravděpodobnost, že v týdnu vybereme samé ženy?



**Příklad 1:** Házení kostkou: házíme třemi hracími kostkami současně (nebo jednou třikrát po sobě). Jaká je pravděpodobnost, že padnou alespoň dvě šestky?




$X = \text{počet šestek}$


$k$	$P(X=k)$
0	0,6757983
1	0,2828923
2	0,0394733
3	0,001836



**Příklad 2:** Kontrola jakosti: Z výrobní linky odebíráme nezávisle na sobě 10 výrobků. Víme, že v produkci jsou 3% vadných. Jaká je pravděpodobnost, že při výběru vybereme alespoň 1 zmetek?



**Příklad 3:** Losování zaměstnance: každý den v týdnu losujeme jednoho z 15ti zaměstnanců, který provede odpolední úklid. Mezi zaměstnanci 10 žen. Jaká je pravděpodobnost, že v týdnu vybereme samé ženy?




X = počet vybraných žen


k	P(X=k)
0	0,0041152
1	0,0411523
2	0,1646091
3	0,3292181
4	0,3292181
5	0,1316872



Binomické rozdělení lze pro velká  $n$  a relativně malá  $k$  approximovat spojitým normálním rozdělením



Binomické rozdělení lze pro velká  $n$  a relativně malá  $k$  approximovat spojitým normálním rozdělením



# Rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny - různé modely

## 4) Hypergeometrický model (model výběru bez vracení)

Experiment, při němž z množiny  $N$  prvků, mezi nimiž je  $M$  prvků s určitou vlastností, vybíráme náhodně postupně  $n$  prvků tak, že po každém výběru vybraný prvek nevracíme zpět mezi ostatní. Zajímá nás kolik prvků s danou vlastností vybereme.

$k$  prvků s danou vlastností z celkového počtu  $M$  můžeme vybrat celkem  $\binom{M}{k}$  způsoby zbylých  $n-k$  prvků bez této vlastnosti můžeme vybrat celkem  $\binom{N-M}{n-k}$  způsoby celkový počet možných  $n$  výběrů z  $N$  prvků je  $\binom{N}{n}$

Tedy:  $P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$

$$N = 1, 2, \dots, \quad M \leq N, \quad n \leq N, \\ \max\{0, n + M - N\} \leq k \leq \min\{n, M\}$$

$$E(X) = n \frac{M}{N}$$

$$Var(X) = \frac{nM(N-n)(N-M)}{N^2(N-1)}$$

Hypergeometrické rozdělení  
s parametry  $N, M, n$ .



# Rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny - různé modely

## 4) Hypergeometrický model (model výběru bez vracení)


**Příklad 4:** Sportka: 49 čísel, ze kterých 6 vyhrává (jsou vytaženy). Jaká je pravděpodobnost, že při výběru 6ti čísel vybereme 4 z tažených?

**Příklad 5:** Kontrola jakosti: 1000 výrobků, mezi nimi jsou 3% vadných. Jaká je pravděpodobnost, že při výběru 10 výrobků vybereme alespoň 1 zmetek?

**Příklad 6:** Výběr uchazečů o práci: z 15ti uchazečů o zaměstnání, mezi kterými je 10 žen, vybíráme anonymně podle výsledku testu 5 osob. Jaká je pravděpodobnost, že to budou samé ženy?



**Příklad 4:** Sportka: 49 čísel, ze kterých 6 vyhrává (jsou vytaženy). Jaká je pravděpodobnost, že při výběru 6ti čísel vybereme 4 z tažených?




$X =$  počet uhodnutých  
tažených čísel


k	P(X=k)
0	0,43596498
1	0,41301945
2	0,13237803
3	0,0176504
4	0,00096862
5	1,845E-05
6	7,1511E-08



**Příklad 5:** Kontrola jakosti: 1000 výrobků, mezi nimi jsou 3% vadných. Jaká je pravděpodobnost, že při výběru 10 výrobků vybereme alespoň 1 zmetek?



**Příklad 6:** Výběr uchazečů o práci: z 15ti uchazečů o zaměstnání, mezi kterými je 10 žen, vybíráme anonymně podle výsledku testu 5 osob. Jaká je pravděpodobnost, že to budou samé ženy?




$X =$  počet mužů  
ve výběru

$k$	$P(X=k)$
0	0,08391608
1	0,34965035
2	0,3996004
3	0,14985015
4	0,01665002
5	0,000333



## 5) Geometrický model (diskrétní doba života)



$$P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$$

$$k = 1, 2, \dots$$

$$P(X = 5) = p(1 - p)^4$$


X je počet kroků, které je třeba učinit, aby nastal první výskyt sledovaného jevu

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

$$Var(X) = \frac{1-p}{p^2}$$



## 5) Geometrický model (diskrétní doba života)



X je počet kroků, které je třeba učinit, aby nastal první výskyt sledovaného jevu

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

$$Var(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Y je počet kroků, které předcházejí prvnímu výskytu sledovaného jevu

$P(Y = k) = p(1 - p)^k$


$k = 0, 1, \dots$

$$E(Y) = \frac{1-p}{p} \quad Var(Y) = \frac{1-p}{p^2}$$

Je-li sledovaný jev porucha, potom se Y nazývá “diskrétní doba života”



## 5) Geometrický model (diskrétní doba života)



$$P(|X - \mu| \leq 3\sigma) = \Phi(3) - \Phi(-3) = 2\Phi(3) - 1 = 0,9973$$

$$P(|X - \mu| \geq 3\sigma) = 0,0027$$

$N$  = počet inspekcí před signálem

$$p = 0,0027$$

$$E(N) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0,0027} = 370$$

Počet inspekcí před prvním falešným signálem (ARL = Average Run Length)

